

Λεζάντες για τις φωτογραφίες που συνοδεύουν το Δελτίο Τύπου για την
Ημέρα Αναγνώρισης της Επιστήμης της Ταξινόμησης 2025 (Taxonomy Recognition Day - TRD)

Οι φωτογραφίες βρίσκονται στο κοινόχρηστο φάκελο εδώ:

<https://drive.google.com/drive/folders/1zputaF5KAgnr2OVqSdK4on8pPFzD2wsM?usp=sharing>

Όνομα αρχείου/φωτογραφία

Λεζάντα



2025_Nhmc_UoC_Collection_labs_
5_TrikaliM.jpg

Προετοιμασία δείγματος για την παλαιοντολογική συλλογή του ΜΦΙΚ-ΠΚ



2025_Nhmc_UoC_Collection_labs_
6-2_TrichasA.jpg

Ψηφιοποιημένο δείγμα από την παλαιοντολογική συλλογή του ΜΦΙΚ-ΠΚ



2025_2024_Nhmc_UoC_Collection
_labs_4_TrikaliM.jpg

Δείγμα από τη Βοτανική συλλογή (Herbarium) του ΜΦΙΚ-ΠΚ



2025_2024_Nhmc_UoC_Collection
_labs_3-2_TrikaliM.jpg

Δείγματα από τη Βοτανική συλλογή (Herbarium) του ΜΦΙΚ-ΠΚ



2025_Nhmc_UoC_Collection_labs_
17_TrikaliM.jpg

Από τη συλλογή Σπονδυλωτών του ΜΦΙΚ-ΠΚ



Από τη συλλογή Ασπονδύλων (εκτός Αρθροπόδων) του ΜΦΙΚ-ΠΚ

2025_Nhmc_UoC_Collection_labs_
14_TrikaliM.jpg



Από τη συλλογή Αρθροπόδων του ΜΦΙΚ-ΠΚ

2025_Nhmc_UoC_Collection_labs_
21_TrikaliM.jpg



Από τη συλλογή Αρθροπόδων του ΜΦΙΚ-ΠΚ




Όπως όλοι οι σκορπιοί, έτσι και ο κίτρινος σκορπιός της Ελλάδας, *Aegaeobuthus gibbosus*, φθορίζει στο υπεριώδες φως.

2025_NHMC_76447_Aegaeobuthu
s gibbosus_KampasA.jpg



2025_Lithobates
catesbeianus106904_4476_Dretaki
sM.jpg

Εισβλητικό είδος. Ο Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (*Lithobates catesbeianus*) είναι αμερικάνικο είδος που εισήχθη στην λίμνη της Αγυιάς Χανίων το 2000, όταν από επιχείρηση που εξέτρεφε βουβαλοβάτραχους για βατραχοπόδαρα διέφυγαν ζώα. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να έχει εκτοπίσει σε μεγάλο βαθμό τον τοπικό πληθυσμό του Κρητικού βατράχου και να πιέζει άλλα είδη της λίμνης.



2025_Trachemys
scripta_112884_DSC0352_Trikali
M.jpg

Εισβλητικό είδος. Οι νεροχελώνες *Trachemys scripta* προέρχονται από την Κεντρική Αμερική και για πολλά χρόνια υπήρξαν δημοφιλείς ως κατοικίδια σε όλη την Ευρώπη η οποία απαγόρευσε την εισαγωγή τους. Λόγω του μεγάλου τελικού τους μεγέθους ή απλώς επειδή τις βαρέθηκαν (!) πολλοί τις ελευθερώνουν σε φυσικά υδάτινα οικοσυστήματα της χώρας. Οι χελώνες αυτές ανταγωνίζονται και τελικά εκτοπίζουν τα ντόπια είδη νεροχελώνων στα οικοσυστήματα που εισβάλλουν, ενώ συχνά είναι φορείς ασθένειών και παρασίτων στα οποία δεν είναι ανθεκτικά τα εντόπια είδη.



2025_Rhynchophorus_ferrugineus_90227_MALE_TrichasA.jpg

Εισβολητικό είδος. Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινικοειδών (*Rhynchophorus ferrugineus*) είναι σκαθάρι που εισήλθε στην Ελλάδα με τις εισαγωγές φοινικοειδών και προσβάλλει πολλά είδη φοινικοειδών, όπως οι χουρμαδιές και οι κοκοφοίνικες, ενώ πρόσφατα εντοπίστηκε και στο φοινικόδασος Βάι της Κρήτης.



2025_Xylotrechus chinensis_121513_TrichasA.jpg

Εισβολητικό είδος. Το *Xylotrechus chinensis* είναι ένα ξυλοφάγο έντομο, από την Ανατολική Ασία, που ήρθε στην Ελλάδα μέσω εμπορίου. Προσβάλλει κυρίως τη μουριά, μπορεί όμως να τραφεί και με άλλα είδη όπως οι μηλιές και το αμπέλι. Προκαλεί σοβαρές ζημιές στο κορμό και τα κλαδιά των δέντρων, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και την νέκρωση τους.



2025_108721_Ailanthus altissima_Avramakis_resize.jpg

Εισβολητικό είδος. Ο Αείλανθος ο υψηλότατος (*Ailanthus altissima*) είναι ιθαγενές φυτό της βόρειας και κεντρικής Κίνας. Στην Ελλάδα εισήχθη ως καλλωπιστικό φυτό, αλλά έχει εξαπλωθεί σε πάρκα, δενδροστοιχίες, μέσα σε τοίχους και στέγες. Η εξάπλωση του οφείλεται στο ισχυρό ριζικό σύστημα, στην αντοχή στη ρύπανση, στην παραγωγή πολλών σπόρων, κ.ά.. Επιπλέον εκκρίνει τοξικές ουσίες που έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ανάπτυξης άλλων φυτικών ειδών. Θεωρείται επικίνδυνο φυτό για την αυτοφυή χλωρίδα της Ελλάδας γιατί μπορεί να απειλήσει τη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.



2025_Agave americana_111082_DSC01898_Bax evaniP.jpg

Εισβολητικό είδος. Ο Αθάνατος (*Agave americana*) είναι ιθαγενές φυτό του Μεξικού και των ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη εισήχθη ως καλλωπιστικό φυτό. Έχει ευρεία εξάπλωση στη Ν. Ελλάδα. Εξαπλώνεται κυρίως με ριζώματα σχηματίζοντας πυκνές συστάδες που δεν επιτρέπουν άλλα αυτοφυή είδη να αναπτυχθούν, καταλαμβάνοντας το ενδιαίτημα τους.



2025_Opuntia ficus-indica_DSC8360_TrikaliM.jpg

Εισβολητικό είδος. Η φραγκοσυκιά (*Opuntia ficus-indica*) προέρχεται από το Μεξικό αλλά πλέον εξαπλώνεται σε όλες τις άνυνδρες και ημι-άνυνδρες περιοχές του κόσμου. Στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί σαν αυτοφυές σε νότιες και νησιωτικές περιοχές όπου το κλίμα είναι συνήθως ξηροθερμικό. Έχει ισχυρό ριζικό σύστημα που του δίνει τη δυνατότητα να αυτοφύεται σε βραχώδεις πλαγιές. Οι βλαστοί του όταν πέσουν στο έδαφος καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια και αποσυντίθενται αργά με αποτέλεσμα να καλύπτουν το έδαφος και να μην αφήνουν τα άλλα αυτοφυή φυτά να ευδοκιμήσουν.